
1.11.12 Aortic valve replacement with the unmounted aortic homograft valve performs most favourably in terms of the risk of thromboembolism (assuming sinus rhythm) but its survival may be shorter than that of the porcine valve, particularly in younger individuals. In the certification of subjects of professional aircrew age, it is likely that a mechanical valve will be recommended on the grounds of its long-term performance and this will disbar from certification to fly. Mitral valve repair due to prolapse of either or both cusps has a survival of 88 per cent at eight years in one review with a 93 per cent freedom from thromboembolic events at six years. The majority maintained NYHA class I status as well as sinus rhythm.



ICAO Ek1-Bölüm 6.3.2.5 ve 7 [8984 Bölüm 1- 1.11.12, 1.11.13 ve 1.11.14] maddesi göre biyolojik kapak yerine metal kapak ile Aort Kapağı tamir edilmesi durumunda elverişlilik verilerek Sınıf 1 sağlık sertifikası düzenlenemiyorken

Aşağıda paylaşılan

PİLVAK Kardiyoloji çalıştay sonuç raporunu dikkate alan SHT-MED KAPSAMINDA AKIŞ ŞEMALARI VE REHBER DOKÜMAN'ında aynı durumda Kaynak Doküman MED.B.010 PİLVAK Kardiyoloji Çalıştay Sonuç Raporu Page 214-UK Civil Aviation Authority Guidance Material Version 2.0 01/05/2013 www.caa.co.uk/medical 'e ve EASA Annex IV(AMC1 MED.B.010(b)(2)(f)(2)(3)]göre Sınıf 1,2,3 ve LAPL sağlık sertifikasına düzenlenebileceğine yönelik ICAO ve EASA arasındaki conflict durum giderilmiştir.

Böylelikle PİLVAK Kardiyoloji çalıştayına katılan SHGM tarafından Kardiyoloji Branşı için belirlenen itiraz ve Kontrol Havacılık Tıp Merkezlerinde çalışan Değerli Uçuş Tabibi Kardiyologlarımızın bilimsel sunum tartışma ve oluşturulan görüşlerine istinaden hazırlanan yeni algoritmanın SHGM tarafından onaylanması ile biyolojik kapak yerine metal kapak ile Aort tamiri yapıldığı durumlarda OML,TML 6 AY VE SSL(UÇUŞUNDAN 12 SAAT ÖNCEKİ INR DEĞERİNİ-CoaguChek S ile ölçülüp _Havacılık personelinin uçuş defterine bu değerlerin işlenmesi koşulu) Kısıtlamaları ile Sınıf 1 düzenlenemeyen üyelerimize Sınıf 1 sağlık sertifikalarının yeniden düzenlenebilmesinin önü açılmış, yüzlerce üyemizin yeni algoritma ile her türlü Aort kapak tamir işlemleri yapılması durumunda belirli şartların yerine getirilmesi ile daha uzun süreler uçuculuk hayatlarına sağlıkla devam edebilmelerine imkan sağlanmıştır.

(f) Valvular surgery

Applicants who have undergone cardiac valve replacement or repair should be assessed as unfit. A fit assessment may be considered in the following cases:

(1) Mitral leaflet repair for prolapse is compatible with a fit assessment, provided post-operative investigations reveal satisfactory left ventricular function without systolic or diastolic dilation and no more than minor mitral regurgitation.

(2) Asymptomatic applicants with a tissue valve or with a mechanical valve who, at least 6 months following surgery, are taking no cardioactive medication may be considered for a fit assessment with an OML. Investigations which demonstrate normal valvular and ventricular configuration and function should have been completed as demonstrated by:

